

Inyección de la Faceta Conjunta

(MBB – Facet)



PAIN MEDICINE ASSOCIATES
your life, your health, pain free

Long Beach Office
3620 Atlantic Ave Long Beach
Long Beach, CA 90807
(562) 595-0060 fax: (562) 595-0027

Fountain Valley Office
18111 Brookhurst St., Suite 3100
Fountain Valley, CA 90708
(714) 963-7240 fax: (714) 963-7224

www.PAINASSOCIATE.com

Inyección de la Faceta Conjunta se presta a confirmar que la faceta articulaciones causa el dolor y el alivio a la espalda o dolor en el cuello y la inflamación. Cada vértebra en la columna vertebral esté conectada a través de dos articulaciones faceta. Un anestésico local adormece la piel y tejido a faceta conjunta.

Médico utiliza fluoroscope y solución de contraste para confirmar la correcta colocación de la aguja de punta. Una mezcla de anestésico y anti-inflamatorios esteroides medicación se inyecta a la articulación. A veces dos o más inyecciones pueden ser necesarias. Si el paciente se siente el alivio del dolor sólo después de la inyección, esto confirma que la faceta articular es la fuente de dolor.

Manejo Del Dolor- Inyección de la Faceta Conjunta

Sin embargo el dolor puede regresar después de efecto anestésico local extremos. Normalmente se tarda aproximadamente una semana para reducir la inflamación y el dolor. El alivio del dolor puede durar hasta varios meses.

Inyección de la Faceta Conjunta efectos secundarios:

Los efectos secundarios comunes pueden ser comunes en comparación con la inyección de efectos secundarios, es decir, reacción alérgica, infección bacteriana, sangrado en los casos rara vez. Esteroides efectos secundarios son la cara, ojos, brazos, piernas hinchazón, el nivel de azúcar cada vez mayor para los pacientes diabéticos.

El paciente debe informar al médico sobre el embarazo o si él / ella toma la medicación adelgazamiento de sangre.

1

Disclaimer: La información provista en esta hoja es general en su contenido y no debe ser visto como un sustituto de consejo médico profesional. Inquietud por condiciones médicas se debe discutir con su médico familiar o un especialista del tratamiento del dolor.